

dicopeg free junior

Saszetki

Makrogol 3350

1. Opis, skład i zastosowanie wyrobu medycznego

1.1 Opis i sposób stosowania

DICOPEG JUNIOR FREE jest wyrobem medycznym mającym postać proszku do sporządzania roztworu doustnego, zalecanym w leczeniu przewlekłych zaparć u dzieci.

1.2. DICOPEG JUNIOR FREE jest wyrobem medycznym o osmotycznym działaniu przeczyszczającym, który w naturalny sposób reguluje pracę jelit. Nie jest wchłaniany i nie ulega fermentacji w jelitach, nie podrażnia błony śluzowej i jest wydalany z kałem w niezmienionej formie. **DICOPEG JUNIOR FREE** jest szczególnie wskazany w przypadku przewlekłych zaparć oraz w sporadycznych przypadkach nieregularnej pracy jelit. Dzięki swoim właściwościom hydrofilowym, **DICOPEG JUNIOR FREE** zmiękcza stolec, ułatwiając wypróżnianie przy czym nie powoduje skurczów, bólów brzucha ani nagłego parcia. Skuteczność wyrobu nie zmniejsza się z upływem czasu.

1.3 Skład

Każda saszetka zawiera 5 g makrogolu 3350.

2. Zalecane dawkowanie

Wskazane jest stosowanie **DICOPEGU JUNIOR FREE** u dzieci zgodnie z następującymi zasadami, chyba że lekarz zaleci inaczej:

Od 6. miesiąca życia do 2 lat (do 12 kg):	1-2 saszetki dziennie
Od 2. do 11. roku życia (od 12 kg do 20 kg):	2-4 saszetki dziennie
Powyżej 11. roku życia (lub > 20 kg):	2-6 saszetek dziennie

Dawka może być odpowiednio zwiększana lub zmniejszana w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na preparat. Prawidłową dawkę dzienną należy określić w oparciu o wagę dziecka i stopień zaparcia.

W każdym przypadku zaleca się konsultację z lekarzem. Podawać małym dzieciom tylko w oparciu o wskazania lekarza.

Maksymalna konieczna dzienna dawka zazwyczaj nie przekracza 30 g produktu na dobę (6 saszetek).

Rozpuścić saszetkę (5 g) w ok. 62,5 ml wody **lub innego płynu, takiego jak herbata, mleko, napary ziołowe, rosół lub soki owocowe**. Dawkę dzienną można zażywać w kilku podaniach. Można rozpuścić wszystkie saszetki przewidziane na dany dzień w odpowiedniej ilości płynu i wstawić roztwór w zamkniętym pojemniku do lodówki na okres nie dłuższy niż 24 godziny. Zaleca się zażywać **DICOPEG JUNIOR FREE** w długich odstępach czasu od posiłków.

3. Działania niepożądane

Szczególnie w początkowej fazie przyjmowania preparatu mogą pojawić się zaburzenia ze strony układu pokarmowego (ból brzucha, burczenie w brzuchu, biegunka lub nietrzymanie stolca), ponadto nudności, lekkie wymioty, wzdęcia, gazy jelitowe, zapalenie i podrażnienie okolicy odbytu. Dolegliwości zazwyczaj ustępują po zmniejszeniu stosowanej dawki. Bardzo rzadko występują reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny. Innymi

reakcjami alergicznymi jest świąd, pokrzywka i duszność.

Jeśli działania niepożądane będą w dalszym ciągu występowały, należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem.

4. Uwagi i środki ostrożności

Przechowywać preparat lub uzyskany roztwór w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

Nie stosować w przypadku uszkodzonego opakowania.

Pod żadnym pozorem nie przekraczać zalecanych dawek: w przypadku przedawkowania mogą wystąpić silne bóle i wzdęcia. Ponadto może wystąpić biegunka powodująca zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej wywołane nadmiernym wypróżnieniem.

W przypadku podejrzenia spożycia nadmiernej ilości preparatu należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. **Nie stosować DICOPEGU JUNIOR FREE dłużej niż 30 dni, jeśli zaparcia nie ustąpiły należy skontaktować się z lekarzem.**

Podczas leczenia **DICOPEGIEM JUNIOR FREE** zaleca się przestrzeganie odpowiedniej diety, uwzględniającej spożywanie doustnego płynu nawadniającego (DPN), który pozwoli uniknąć odwodnienia. Zaleca się konsultację z lekarzem.

5. Przeciwwskazania i ograniczenia użycia

Nie stosować u dzieci poniżej 6. miesiąca życia.

Stosowanie preparatu nie jest wskazane w przypadku: perforacji lub niedrożności jelit spowodowanej zaburzeniami budowy lub działania ścian jelit, jelita krętego, w przypadku schorzeń jelit o charakterze zapalnym, takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego i ostre rozdęcie okrężnicy. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na makrogol (glikol polietylenowy). Nie stosować w przypadku występowania uszkodzeń żołądka lub jelit. Produkt jednorazowego użycia: nie stosować części zawartości saszetki lub produktu z wcześniej otwartej saszetki (narażenie na ryzyko skażenia produktu).

6. Stosowanie innych leków, wyrobów medycznych i suplementów diety

Nie stwierdzono interakcji preparatu z żadnymi lekami, wyrobami medycznymi i suplementami diety, ale zaleca się jego przyjmowanie w odstępie co najmniej 2 godzin od momentu ich zażycia, ponieważ właściwości osmotyczne makrogolu i wywołany tym przyspieszony pasaż jelitowy mogą w niekorzystny sposób wpłynąć na skuteczność ich działania.

W przypadku stosowania innych leków, przed zażyciem **DICOPEGU JUNIOR FREE** należy skonsultować się z lekarzem.

7. Sposób przechowywania

Nienaruszone opakowanie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł światła i ciepła, w temperaturze nieprzekraczającej 25°C. Podana data przydatności do spożycia odnosi się do produktu poprawnie przechowywanego w nienaruszonym opakowaniu. Nie należy stosować produktu po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu zbiorczym i na saszetce.



Wyrób medyczny. Nie należy wyrzucać do śmieciów i odpadów komunalnych. Informacje dotyczące utylizacji nieużytych wyrobów medycznych można uzyskać od farmaceutów. W ten sposób pomagamy chronić środowisko naturalne.

Dystrybutor: Vitis Pharma Sp. z o.o.
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, Polska
www.vitispharma.pl

 SIIIT Srl, Via Ariosto, 50/60, 20090 Trezzano s/N (MI), Włochy

VITIS 
Pharma