

dicopeg junior

Dicopeg Junior jest wyrobem medycznym o osmotycznym działaniu przeczyszczającym, który w sposób naturalny reguluje pracę jelit. Nie jest wchłaniany i nie ulega fermentacji w jelitach. Nie podrażnia błony śluzowej. Jest wydalany z kałem w niezmiennionej formie. **Dicopeg Junior** jest szczególnie zalecany w przypadku przewlekłych zaparć oraz w przypadku sporadycznych zaburzeń pracy jelit. Dzięki swoim właściwościom hydrofilowym **Dicopeg Junior** zmiękcza stolec ułatwiając wypróżnienie przy czym nie powoduje skurczów, bólów brzucha ani nagłego parcia. Skuteczność wyrobu nie zmniejsza się z upływem czasu.

Dicopeg Junior ma postać proszku do sporządzenia roztworu doustnego.

Skład: makrogol 3350. Substancje pomocnicze: dwutlenek krzemu, aromat, sól sodowa sacharyny. **Nie zawiera glutenu.**

Dicopeg Junior dostępny jest w następujących opakowaniach:

- **Dicopeg Junior 5 g** – 14 saszetek po 5 g

Zalecane dawkowanie (Dicopeg Junior 5 g):

Od 6 miesiąca życia do 2 lat (do 12 kg): 1-2 saszetki dziennie

Od 2 do 11 roku życia (od 12 kg do 20 kg): 2-4 saszetki dziennie

Powyżej 11 roku życia (lub > 20 kg): 2-6 saszetek dziennie

Dawkę można zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie. Zaleca się w tym celu skonsultować z lekarzem. Przed podawaniem produktu małym dzieciom należy zawsze skonsultować się z lekarzem. Zazwyczaj największa potrzebna dawka dzienna nie przekracza 6 saszetek.

Sposób stosowania: należy rozpuścić zawartość saszetki w 1/2 szklanki wody (62,5 ml) i wypić sporządzony roztwór. Dawkę dzienną można zażywać w kilku podaniach. Można rozpuścić wszystkie saszetki przewidziane na dany dzień w odpowiedniej ilości wody i wstawić roztwór w zamkniętym pojemniku do lodówki na okres **nie dłuższy niż 24 godziny**. Zaleca się zażywać Dicopeg Junior w długich odstępach czasu od posiłków.

Kiedy nie należy stosować wyrobu: nie należy stosować Dicopeg Junior w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na makrogol, w przypadku perforacji i/lub niedrożności układu pokarmowego, zmian chorobowych układu pokarmowego lub wydalniczego, poważnych chorób zapalnych jelit, takich jak choroba Leśniewskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ostre rozdęcie okrężnicy.

dicopeg junior

Interakcje z innymi lekami: nie stwierdzono interakcji preparatu z innymi lekami, niemniej zaleca się zażywanie Dicopeg Junior w odstępie co najmniej 2 godzin od zażycia innych leków doustnych, ponieważ działanie osmotyczne makroglu oraz przyspieszenie pasażu jelitowego mogą zmniejszyć ich skuteczność. **W trakcie leczenia innymi lekami, zaleca się skonsultowanie z lekarzem przed rozpoczęciem zażywania Dicopegu Junior.**

Działanie niepożądane: w początkowym okresie terapii mogą wystąpić zaburzenia układu pokarmowego (ból brzucha, burczenie w brzuchu, biegunka, nietrzymanie kału, nudności, lekkie wymioty, wzdęcia, wiatry, stany zapalne i podrażnienie okolic odbytu), ale zazwyczaj znikają w dalszym okresie zażywania lub po zmniejszeniu dawki. Jeśli powyższe dolegliwości utrzymują się, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne (wysypka skórna, pokrzywka, śwιάd, duszności). Należy wtedy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

Przedawkowanie: w przypadku przedawkowania mogą wystąpić silne bóle, wzdęcie, biegunka, zaburzenie równowagi elektrolitycznej. Powyższe objawy ustępują samoistnie po przerwaniu leczenia, należy jednak niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Uwagi i sposób przechowywania: preparat należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, suchym miejscu, w temperaturze nieprzekraczającej 25°C. Podana data przydatności do spożycia odnosi się do produktu poprawnie przechowywanego w nienaruszonym opakowaniu. Nie należy stosować produktu po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu zbiorczym i na saszetce. Nie należy zażywać większych dawek niż zalecane. Produkt jednorazowego użycia: nie stosować części zawartości saszetki lub produktu z otwartej dawniej saszetki (naraża to na ryzyko skażenia produktu). Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. **Nie podawać dzieciom poniżej 6 miesiąca życia.** Podczas stosowania Dicopeg Junior należy przestrzegać odpowiedniej diety, uwzględniającej spożywanie doustnego płynu nawadniającego (DPN), który pozwoli uniknąć odwodnienia. Zaleca się także konsultację z lekarzem. Jeśli okres stosowania produktu przekracza 30 dni, zaleca się przerwę w stosowaniu na 3-5 dni.



Wyrób medyczny. Nie należy wyrzucać do śmieciów i odpadów komunalnych. Informacje dotyczące utylizacji nieużytych wyrobów medycznych można uzyskać od farmaceutów. W ten sposób pomagamy chronić środowisko naturalne.

Dystrybutor: Vitis Pharma Sp. z o.o.
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, Polska
www.vitispharma.pl

 SIIT Srl, Via Ariosto, 50/60, 20090 Trezzano s/N (MI), Włochy

VITIS 
Pharma