

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego

Dicodral® 60

saszetki

12 saszetek

Produkt o smaku bananowym.

Do postępowania dietetycznego w celu:

- zmniejszenia ryzyka odwodnienia
- wyrównania zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej

Dicodral 60 jest preparatem w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej, który zawiera składniki (elektrolity i glukoza) służące do przygotowania po rozpuszczeniu w wodzie doustnego płynu nawadniającego o osmolarności min. 222 mOsm/l.

Składniki:

glukoza, cytrynian sodu, chlorek potasu, chlorek sodu, aromat bananowy.

Wartość odżywcza	100 g	1 saszетка (4,8 g)
Wartość energetyczna	1132,1 kJ/266,4 kcal	54 kJ/13 kcal
Tłuszcz	0,00 g	0,00 g
w tym kwasy tł. nasycone	0,00 g	0,00 g
Węglowodany	66,54 g	3,181 g
w tym cukry	65,20 g	3,117 g
Białko	0,00 g	0,00 g
Sól	14,36 g	0,689 g

	g/l	mmol/l
Glukoza	14,930	90
Sód	1,378	60
Chlorki	1,32	37
Potas	0,787	20
Cytryniany	2,701	14
Osmolarność (mOsm/l)	222,655	

Produkt bezglutenowy.

Zalecana dzienna porcja do spożycia:

Ilość, dobowa porcja oraz czas stosowania produktu u niemowląt, dzieci i dorosłych, które wpływają na wywołanie efektu zdrowotnego są uzależnione od wieku, masy ciała oraz fazy nawadniania. Stosować według wskazań lekarza.

Proponowany sposób podawania preparatu Dicoltral 60 w biegunce, w przypadku umiarkowanego odwodnienia nie wymagającego hospitalizacji i nawadniania drogą dożylną:

Masa ciała	FAZA REHYDRACJI	FAZA PODTRZYMUJĄCA
	Ilość porcji* Dicoltral 60, którą należy podać w ciągu 4 pierwszych godzin postępowania. Należy przestrzegać zaleceń lekarza.	
<6 kg	2-3 porcje	Dicoltral 60 lub inny DPN w ilości koniecznej do zaspokojenia podstawowego zapotrzebowania na płyny i uzupełnienia bieżących strat wody.
7-10 kg	2-6 porcji	
11-15 kg	3-9 porcji	
16-20 kg	5-11 porcji	
21-25 kg	6-14 porcji	
>25 kg	minimum 7 porcji	

* opakowanie zawiera 12 porcji produktu, jedną porcję należy rozpuścić w 200 ml wody.

Zalecana ilość porcji uwzględnia uzupełnienie oszacowanego niedoboru płynów w fazie rehydracji (4 pierwsze godziny postępowania – 50-100 ml doustnego płynu nawadniającego/kg mc.) oraz uzupełnienie utraty płynów przy założeniu wystąpienia 2 dodatkowych płynnych stolców w trakcie fazy rehydracji (5-10 ml doustnego płynu nawadniającego/kg m.c. po każdym płynnym stolcu lub wymiotach).

Bez substancji konserwujących, barwników i substancji słodzących.

Sposób przygotowania i sposób użycia:

Należy skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania informacji o właściwym stosowaniu produktu u niemowląt i dzieci. Zawartość saszetki należy rozpuścić w 200 ml wody i spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.

Ważne informacje:

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia ustalonej przez lekarza. Produkt należy przyjmować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik produktu.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Okres ważności dotyczy produktu przechowywanego w oryginalnym opakowaniu zgodnie z zaleceniami producenta.

Wyprodukowano w:

S.I.I.T srl
Via Ariosto, 50-60
20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Włochy

Dystrybutor:

Vitis Pharma Sp. z o.o.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
tel. +48 22 526 86 00
www.vitispharma.pl



Zawartość opakowania:

Masa netto: 57,6 g
12 saszetek po 4,8 g